

# ËSHTË KOHA TË FLASIM PËR INFEKSIONET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME (IST)

VITORI HASANI\*

## Summary

### INFORMATION AND PRACTICES ABOUT SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF VLORA, ALBANIA

Sexually Transmitted Infections (STIs) constitute a major worldwide factor of acute disease not only with psychological effects, but also leading to infertility, long-term disability, as well as premature death for millions of men, women and children.

**Methods:** A cross-sectional study was conducted in 2007 which included all students (N= 844) of the University of Vlora. An anonymous self-administered questionnaire was applied which included socio-demographic and socio-economic data, STI knowledge and sexual practices.

**Results:** Male students had much less information than the females: average mean knowledge score for males was 5.1 as compared to 5.9 for females (P=0.01) (Table no.1).

It also resulted that the students born or living in rural areas were significantly less informed on STIs than those from urban areas: knowledge average of rural areas students resulted 5.0 versus 5.8 for urban areas students (P< 0.01).

**Discussion:** Our survey clearly indicates a close connection of patient' education and urban residence with a higher level of information on STIs. The average level of such knowledge in our students turned out to be low. The fact that the sexual behaviour of the youth is characterized by disregard of the imminent risk of STIs (especially HIV or hepatitis B) implies a real issue for public health service in Albania, and that immediate action is necessary.

Infeksione seksualisht të trasmetueshme (IST) janë një faktor madhor të sëmundshmërisë akute me pasoja psikologjike, infertilitet, paaftësi afatgjatë si edhe vdekje për miliona burra gra dhe fëmijë në botë. Njihen reth 28 lloje sëmundje seksualisht të trasmetueshme si HIV-SIDA, hepatit B, sifilizë, gonore, klamidia, papiloma etj. Sot në botë këto infeksione janë shqetësim serioz për shëndetin e komunitetit dhe nga viti në vit numri i të prekurve vjen duke u rritur.

Nga raportimet e OBSH rezulton se:

- Në vitin 1990 numri i rasteve të reja me IST të kurueshme arrin në 250 milion.

- Në vitin 1995 numri i rasteve të reja me IST të kurueshme arrin në 333 milion.

- Në vitin 1999 numri i rasteve të reja me IST të kurueshme rritet në 340 milion.

- Në vitin 2006 numri i rasteve të reja me IST të kurueshme arrin vlerën 450 milion.

Shqetësues është fakti se shtrirjen më të madhe IST e kanë në moshë mesatarisht të reja (15-49 vjeç). Numri më i madh i rasteve të reja raportohen në Azinë

\* Dërguar në Redaksi në Janar 2008, miratuar për botim Mars 2008.

Nga Departamenti i Infermieristikes, Universiteti "Ismail Qemali" Vlore.

Adresa për letërkëmbim: Hasani V. Departamenti i Infermieristikes, Universiteti "Ismail Qemali" Vlore.