

HEMORRAGJITË VAGINALE PAS KONTAKTIT SEKSUAL QË KANË SHKAK INFEKSIONIN GENITAL TË CHLAMYDIAS

ARDIAN HAJDËRI, MIMOZA KETA, ELSA KONE*

Summary

VAGINAL HEMORRHAGES AFTER THE SEXUAL INTERCOURSES CAUSES BY CHLAMY GENITAL INFECTION

The Objective: To put into evidence the epidemiological and etiologial specifics to women with STD that present the spot after the sexual intercourses.

The Material and the Methodology: Out of 346 women who underwent a gynecological examination, a Pap-Smear test and a simple vaginal test, 47 were selected to undergo the test of Chlamydia Trachomatis. These 47 women presented a vaginal hemorrhage after the sexual intercourses. To put into evidence this infection the Enzyme Immune test was used.

The result: The average age of the women who had hemorrhage after sexual intercourses was 36 years old; while 18 women, or 38% of the cases were women of the age up to 25 years old. Only three of the cases were unmarried women, or 13.6% of the women who had vaginal hemorrhage after sexual intercourses. Chlamydia Trachomatis Genital infection was diagnosed to 28 women or to 8.1% of the women who underwent gynecological examination.

The Chlamydia Trachomatis test resulted positive to 28 cases.

The Conclusion: The vaginal hemorrhage after sexual intercourse shows how indispensable is the medical check up test to find out the infection of Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhea and other pelvic inflammatory diseases.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në të gjithë botën rreth 330 milion njerëz në vit janë të prekur nga SST. Më e përhapura është sëmundja e trichomoniazës, e cila është dalluar në rreth 170 milion raste, infeksioni i dytë për nga numri i personave të infektuar është *chlamydia me rreth 80 milion raste*, gonorreja me rreth 25 milion raste, sifilisi me rreth 12 milion raste etj. (1). Studiues të ndryshëm preokupohen nga fakti se një e treta e rasteve të paraqitura me infeksionin genital chlamydia

trachomatis janë të moshës jo më të madhe se 25 vjeç (2). Emergjencën sanitare këto studiues e shikojnë në vendet që janë në zhvillim e sipër, prandaj do të ishte mençuri të kontrollohet gjendja dhe tendenca e këtij infeksioni edhe në vendin tonë.

Bartësit mund të jenë simptomatik ose asimptomatik, kështu që pjesa asimptomatike mbetet e padiagnostikuar. Infeksioni genital i patrajtuar i chlamydias mund të ketë pasoja të largëta kryesisht te gratë ku mund të jetë shkak i një PID (sëmundje

* Dërguar në Redaksi në Shkurt 2007, miratuar për botim Prill 2007.

Nga Spitali Universitar Obstetrike-Gjinekologji "Koço Gliozheni", Tiranë.

Adresa për letërkëmbim: Hajderi A., Spitali Universitar Obstetrike-Gjinekologji "Koço Gliozheni", Tiranë.