

## MANIFESTIMET KLINIKE TË MENINGITEVE

GJERGJ KOJA\*

### Summary

#### CLINICAL MANIFESTATIONS OF MENINGITIS

This short edition is focused principally on the clinical manifestations of meningitis disorders caused mainly by neisseria meningitidis, streptococcus pneumoniae and haemophilus influenzae. But also this edition classifies these disorders in: acute (within 24 hours); sub acute (within 1-3 days) and chronic (within 3-7-10 days). This infectious disease caused especially by neisseria is diffused all over the world, it is a sporadic infection and more often during the winter and spring seasons. It can be a viral infection, too. This infection can be met as a complication of influenza or as a complication of otitis media.

It is well clarified that the constant clinical features are intensive neck headache, spontaneous vomits in spite of nutrition (cerebral vomits), psychic alterations, convulsions of grand mal type and tremble, disorders of cranial nerves etc.

Besides of constant clinical features, there are some specific neurological signs like Ammos sign, Brudzinski and Kernig clinical sign. We can find in this edition even a comparison system between sepsis situation and neonatal meningitis. This system is based on some symptoms like fever, difficulties in respiration, some gastrointestinal disorders and some Central Nervous System disorders too.

It mentions that in spite of intensive therapy with antibiotics, the prognosis remains still reserved and not so much optimistic, especially for neonates and children.

The aim of having good knowledge regarding the clinic of meningitis is to help the right diagnoses together with the laboratories examinations. This is very important for a good and efficient therapy.

Klinika e infeksioneve të cipave meningeale apo siç quhet ndryshe e meningiteve nuk është e panjohur, apo e pastudiuar nga mjekësia botërore. Por shfaqja e frikshme e më shumë se 100 rasteve të meningitit me etiologji kryesisht bakteriale në Itali në një periudhë të shkurtër kohe dhe e pasuar me 5 vdekje, rikthen vullshëm jo vetëm panikun, por edhe vëmendjen maksimale të kërkimit shkencor mjekësor, si dhe të institucioneve të kujdesit shëndetësor në Itali dhe jo vetëm atje, mbi domosdoshmërinë e pasurimit

dhe kompletimit të njohurive të domosdoshme në lidhje me etiologjinë, epidemiologjinë, klinikën, diagnostikimin laboratorik, mjekimin dhe profilaksinë ndaj meningitit.

Si të mos mjaftonte kjo, si në një reaksion zinxhir filluan të raportoheshin edhe raste me frekuencë më të lartë se e zakonshmja të meningiteve në Shqipëri, brenda një periudhe të shkurtër kohe (dhjetor-janar 2008) kryesisht me etiologji bakteriale dhe me një gjeografi sëmundshmërie që fliste apo kishte lidhje

\* Dërguar në Redaksi në Janar 2008, miratuar për botim Shkurt 2008.

Nga Instituti i Shendetit Publik, Tirane.

Adresa për letërkëmbim: Koja Gj., Nga Instituti i Shendetit Publik, Tirane.