

## CEFALIA NË MOSHËN PEDIATRIKE

RAIDA PETRELA, MARIA DI LEGGE\*

### Summary

### HEADACHE IN PEDIATRICAGE

Headache is one of the most frequent causes of hospitalization in the pediatric services, this depending on its intensity and on the suffering it causes to children.

The possibility that it may be a symptom of dangerous diseases, poses to an alarm situation both parents and treating physicians.

Cefalea është një nga shkaqet më të shpeshta të shtrimeve në repartet pediatrike, si për arsye të shpeshtësisë, qoftë dhe për gjendjen e vuajtjes që shkakton tek fëmijët.

Mundësia e ekzistencës së sëmundjeve të rënda që ajo mund të zbulojë, vë në një gjendje alarmi si prindërit ashtu dhe vetë pediatrën.

#### Objektivat dhe metodat

Ky studim ka si objektiv të nxjerrë të dhëna epidemiologjike, klinike e diagnostike në një grup pacientësh të shtruar praën repartit tonë nga viti 1999-2004. U morën në studim 58 pacientë të prekur nga cefalea. 31 pacientë (53.4%) ishin shtruar me cefale acute, pjesa tjetër prej 27 pacientë (46.5%) ishin shtruar për shkak të një episodi intensive të një cefaleje rekurrenente prej disa muajsh. Në praktikën diagnostike si objektive kryesore na doli diferencimi i cefaleve në:

- Parësore ose thelbësore.
- Dytësore e ose simptomatike të sëmundjeve intra ose ekstrakraniale, ose të
- Sëmundjeve sistemike.

#### Rezultatet

Nga studimi ynë doli se numri më i madh i shtrimeve i përkiste moshave mes 6-13 vjeç me një pik në moshën 12-13 vjeç (moshë që korrespondon me kalimin nga sistemi shkollor i fillores në atë 8-vjeçar). Studimi për shpërndarjen sipas muajve vërtetoi një shpeshtësi më të madhe në muajt e fillimit dhe të mbarimit të shkollës. Në vitet e para të moshës shkollore, u vë re se shpeshtësia mes sekseve ishte e njëjtë, ndërsa pas moshës 12-vjeç vihej re një shpeshtësi më e madhe tek femrat.

U evidentuan:

- 30 raste (51,7%) me cefale dytësore:
- 20 raste me sëmundje febrile akute nga të cilat 6 raste me sinusit frontal dhe/ose maksilar
- 7 raste me trauma kraniale,
- 1 rast me meningit nga pneumokoku,
- 1 rast me encefalopati akute,
- 1 rast me hipertension arterial në rrjedhën e një glomerulonefriti akut.

28 raste (48,3%) me cefale parësore:

- 15 raste me hemikrania të zakonshme,
- 4 raste me hemikrania me aura,

\* Dërguar në Redaksi në Mars 2007, miratuar për botim Qershor.

Nga Departamenti i Pediatrie, Fakulteti i Mjekësisë, Tirane.  
Adresa për letërkëmbim: Petrela R., Departamenti i Pediatrie, Fakulteti i Mjekësisë, Tirane.

