


Generation

III



Sparflo

SKALITJA E NJE  
FLUOROKINOLONI  
ABSOLUTISHT SUPERIOR.



# Lusopress®



## Lusopress®



*Parandalon ngjarjet e padëshirueshme  
kardiovaskulare dhe cerebrale (insulti cerebral)*



*Kontroll optimal i presionit arterial*



*Parandalon demencien*

*Tolerohet shumë mirë nga pacienti*

*Përdoret vetëm një herë në ditë*



**BERLIN-CHEMIE**

**Healthcare for life**



# Besim i fituar nga eksperienca

- Fluorokinoloni i vetëm që ushtron veprim lokal në traktin urinar
- Vepami antimikrobiale është i përqendruar kundër bakterieve që shkaktojnë infeksione të traktit urinar
- Antibiotiku urinar më efektiv në trajtimin dhe profilaksinë e infeksioneve të traktit të poshtëm urinar

# NOLICIN<sup>®</sup>

tableta  
norfloksacinë

Informacion i përbledhur mbi mënyrën e përdorimit

**Spektri antimikrobiale:** Bakteriet aerobe gram-negativë, përfshirë *Pseudomonas aeruginosa*, dhe stafilokokun. **Indikacionet:** Infeksione akute dhe kronike të traktit urinar, prostatit kronik bakterial, gonorea; parandalim i infeksioneve të traktit urinar që përsëriten shpesh; parandalim dhe trajtim i infeksioneve bakteriale të traktit gastrointestinal (diarrea e udhëtarit); parandalim i infeksioneve gram-negativë tek pacientët e imunokompromentuar. **Dozimi:** 2 x 1 tabletë në ditë. Kohëzgjatja e trajtimit varet nga indikacioni. Për trajtimin profilaktik të infeksioneve të traktit urinar që përsëriten shpesh dozimi është gjysmë tablete në ditë, e marrë në mënyrë të rregullt për 1 deri 2 vjet. Për parandalimin e diarresë së udhëtarit dozimi është një tabletë në ditë. Trajtimi duhet filluar një ditë para nisjes, duhet vazhduar gjatë udhëtimit si edhe dy ditë pas kthimit (nuk rekomandohet zgjatja e trajtimit për më shumë se 21 ditë). Për parandalimin e sepsis gram-negativ në pacientët neutropenikë dozimi është 2 x 1 tabletë në ditë deri 8 javë ose gjatë fazës neutropenike. Doza ditore maksimale është 1600 mg. Pacientët duhen këshilluar ta marrin Nolicinën një orë para ose dy orë pas ushqimit. Në funksion renal të dëmtuar (klieransi i kreatinës më pak se 0.33 ml/s ose niveli i kreatinës në serum më shumë 400 µmol/l), doza duhet përgjysmuar ose duhet dyfishuar intervali midis dozave. Tek pacientët në hemodializë, me diurezë të mbajtur, doza duhet përgjysmuar, ndërsa tek ata në CAPD nuk nevojitet rregullim doze nëse diureza mbahet. **Efektet anësore:** Shqetësime gastrointestinale, dhimbje koke, marrje mendsh, reaksione alergjike. Tek pacientët e moshuar mund të shfaqet lodhje, përgjumje dhe konfuzion. Mund të ndodhin ndryshime në disa rezultate laboratorike. Fluorokinolonet mund të shkaktojnë shumë rrallë, zakonisht në kombinim me faktorë të tjerë të dëmshëm tendinit ose rupturë të tendinit. **Ndërveprimet:** Qumështi, kosi, antacidet, sulkralfati, dhe preparatet që përmbajnë hekur dhe zink zvogëlojnë absorbimin e Nolicinës. Marrja e njëkohshme e Nolicinës me teofilinë ose ciklosporinë rezultojnë në rritjen e përqendrimit të kësaj të fundit në serum. Marrja njëkohësisht e Nolicinës dhe varfarinës mund të fuqizojë efektin terapeutik të varfarinës. **Kundërindikacionet:** Mbindjeshmëri ndaj barit ose kinoloneve të tjera, shtatzani dhe ushqyerje me gj. fëmijë. **Masa paraprake:** Gjatë gjithë trajtimit duhet mbajtur diurezë normale. Është i nevojshëm kujdes tek pacientët me shqetësime në SNQ. Pacienti duhet të evitojë ekspozimin e tepruar ndaj rezeve të diellit dhe sforcimit fizik ndërsa është nën trajtim. **Paralajmërimet të veçanta:** Nolicina mund të shkaktojë marrje mendsh duke ulur kështu kohën e reagimit të pacientit, veçanërisht nëse merret bashkë me alkoolin. **Ambalazhimi:** 20 tableta 400 mg.

Për informacione të mëtejshme drejtohuni tek prodhuesi



Zyra e Përfaqësimit në Tiranë  
Rr. Sami Frashëri, P. i Aviacionit,  
Shtesa 1, Ap. 6  
Tiranë  
Tel: (04) 250 597  
Fax: (04) 250 597

# Buletini i Shkencave Mjekësore

Organ i Universitetit të Tiranës

## Buletini i Shkencave Mjekësore

Boton punime origjinale me nivel të lartë shkencor në lëmin e mjekësisë. Punimet mund të jenë me karakter klinik dhe laboratorik. Buletini është i pajisur me tabelën e përmbajtjes dhe abstrakte në anglisht.

**Kryeredaktor : BARBULLUSHI Myftar**

**Anëtarë të redaksisë:** BASHO J, GLIOZHENI O, GODA A, GODO A,  
KAÇANI N, KRUJA J, KONDILI A, PRIFTANJI A, MARKU N,  
QAFMOLLA R, REFATLLARI A.

**Redaktor letrar:** Nevina Gami

**Faqosja:** Lilliana Vathi

### Konsulentë të Redaksisë

BULO A.	PANO K.
CIKULI M.	PETRELA M.
ÇAKËRRI L.	QIRKO S.
ÇELA M.	RADOVANI P.
DEDA L.	RESULI B.
DEGA S.	SELIMAJ E.
KAKARIQI E.	SULI A.
KAPISYZI P.	SULÇEBE G.
KERRAJ F.	TASE M.
KONE E.	TUSHE E.
KOROSHI A.	YLLI A.
MAZREKU A.	XHANI M.
MINGA GJ.	XHUMARI P.

### Bordi Konsultativ Ndërkombëtar

CIVATI G. /Milano, Itali  
D'AMATO G. / Itali  
KASTRATI A. / Mynih, Gjermani  
KEITH F. / California, U.S.A.  
LEYNADIER F. / Paris, Francë  
MIGLIORI P.A. / Padova, Itali  
MILLIEZ J. / Paris, Francë  
MORONI M. / Milano, Itali  
PADRINI P. / Itali

**Botimet:** Letërkëmbimet lidhur me botimet dërgohen në këtë adresë:  
Myftar Barbullushi, Kryeredaktor i Buletinit të Shkencave Mjekësore.  
Qendra Spitalore Universitare Tiranë  
Rruga e Dibrës, Nr. 370, Tiranë  
Tel.: 042-336-44, Fax: 068 20 45638  
*Udhëzime për Autorët* gjenden në çdo numër. Autorët duhet të njihen me këto udhëzime para se të dërgojnë dorëshkrimet për botim

**Adresa për abonimet:** Buletini i Shkencave Mjekësore  
Fakulteti i Mjekësisë  
Rruga e Dibrës, Tiranë  
Tel.+Fax:042-627-10

**Reklamat:** Revista pranon të botojë reklama për prodhime mjekësore dhe lajmërimi të ndryshme në fushën e mjekësisë. Tarifat për këtë qëllim vendosen me marrëveshje.  
*Adresohuni:*  
Buletini i Shkencave Mjekësore  
Fakulteti i Mjekësisë  
Rruga e Dibrës, Tiranë  
Tel.+Fax:042-627-10  
Botimi i Reklamave nuk do të thotë se Revista jep garanci për prodhimet përkatëse dhe as se i mbështet pretendimet e prodhuesit.

**Shtypja e Buletinit:** U realizua në Shtypshkronjën e Fakultetit të Mjekësisë

## BULETINI SHKENCOR — FORMË DHE PËRMBAJTJE NË PROGRES

Buletini shkencor del sot me numrin e dytë radhas dhe me kënaqësi do të doja t'ju konfirmoja vazhdimësinë e tij mbështetur në një numër artikujsh të ardhur në redaksi, që presin radhën për botim.

Buletini del sot me *dy artikuj të ardhur nga Italia dhe Maqedonia*, çka na lë të shpresojmë që numri i parë ka qenë impresionues.

*Është koha për ndryshime dhe vazhdimësi* — interrogativi i çdo botuesi që pretendon suksesin.

Në këtë kuadër, krahas punimeve origjinale, organizimit të rubrikës së editorialit, komunikimeve të shkurtra, përshkrimeve të rasteve, si dhe letrave në redaksi, numri i ri sjell një *redaksi konsulentësh me personalitete të mjekësisë botërore*, të cilët miratuan me kënaqësi bashkëpunimin e tyre aktiv me

revistën. Gjithashtu, në mbështetje të "erës" së mjekësisë së bazuar në evidenca, buletini hapi në këtë numër një rubrikë të veçantë me *protokolle mjekimi apo linja guidë të diagnozës dhe mjekimit*.

Protokolli i mjekimit të hipertensionit në shtatzëni, i cili u realizua nga mjekët tanë së bashku me kolegë francezë, italianë dhe amerikanë, shënon hapjen e kësaj rubrike të re, që konfirmon edhe një herë interrogativin *ndryshime në vazhdimësi*.

Një faqe zyrtare në internet, ku do të publikoheshin abstrakte të punimeve në anglisht dhe shqip, do të ishte një premtim i stafit për numrin e ardhshëm.

Ne do t'iu luteshim lexuesve tanë të na dërgojnë përshtypjet e tyre për buletin dhe, çka është më e rëndësishme, sugjerimet e tyre që nga forma e deri në përmbajtje.

**Kryeredaktori i Buletinit Shkencor  
Prof. As. Myftar Barbullushi**