

RINGRITJA E STRATEGJISË PËR DEPISTIMIN DHE TRAJTIMIN E HERSHËM TË DZHK

ARTID DUNI, GJERGJ ÇAUSHI*

Summary

REBUILDING THE STRATEGY FOR SCREENING AND EARLY TREATMENT OF DDH

Abstract: Many years have passed since the monumental work of a pleyad of orthopedic professionals leaded by Prof. Boga brought the treatment of DDH in true scientific basses. It is time now after the huge social and demographic changes in Albania, to reevaluate what is happening in the field of early diagnosis and screening of this crippling condition.

We retrospectively studied the records of 2852 children treated in the Outpatient Department of the University Service of Orthopedics and Trauma during 1999-2004, with the goal to investigate the rate of early detection of DDH among all of the children treated in our facility.

The percentages resulted to be very low, at the range of 1.3%-1.6% without the rissing curve through years, and the majoriy of children were reffered to us after the valking age. This dictates the need for imperative changes in the strategy of early detection, screening and treatment, building new policies and new protocols where ultrasound egzamination will have a key role.

Megjithë përparimet e jashtëzakonshme në fushën e trajtimit të displazisë në zhvillim të artikulationit koksofemoral (term që tashmë ka zëvendësuar plotësisht togfjalëshin e vjetër *Luksacion Kongenital* dhe për të cilën më poshtë do të përdoret akronimi DZHK-së), kjo sëmundje mbetet ende një sfidë e madhe për kirurgun ortoped si dhe një problem i madh në drejtim të diagnostikimit të hershëm për të gjithë sistemet mjekësore. Në këtë artikull ne menduam të ndalemi në atë që në një farë mënyre duhet të jetë dhe pikësynimi i punës së çdo kirurgu ortoped; diagnostikimin dhe trajtimin në moshë sa më të vogël dhe trajtimin

e displazisë zhvillimore nën moshën një vjeç. Parimi i trajtimit të DZHK-së me pajisje abduktore është vetëcentrimi gradual i kokës femorale në kavitetin acetabular dhe stimulimi reciprok i zhvillimit të të dy komponentëve nëpërmjet lëvizjeve të kokës femorale në acetabul.

Colemani (3) (1978), njëri nga korifejtë e trajtimit të DZHK-së, thekson se "*pelvisi gjatë vitit të parë të jetës zhvillohet më shpejt se sa në çdo vit tjetër të saj të marrë veçmas*" prandaj trajtimi korrekt i DZHK nën këtë moshë ka një rëndësi themelore për prognozën e sëmundjes (figura nr. 1).

* Dërguar në redaksi në Maj 2008, miratuar në Qershor 2008.

Nga Departamenti i Ortopedi-Traumatologjisë.

Adresa për letërkëmbim: Duni A.: Departamenti i Ortopedi-Traumatologjisë.