

GALEAZZI FRACTURE-DISLOCATIONS, ALTERNATIVAT E TRAJTIMIT BASHKEKOHOR

JULIAN RUCI, ARTID DUNI, ERAUD GOGU*

Summary

DISLOCATIONS, THE ALTERNATIVES OF CONTEMPORARY TREATMENT

We are discussing about radial distal third fractures, complicated with disruption of the distal radioulnar joint. There is a variety of treating solutions, between surgical and conservative management, specially in children. We have reviewed 15 patients with this diagnose, treated with plaster immobilization or by open reduction. This type of traumatic disorder causes serious problems in everyday life and in disability of the arm.

Frakturat e diafizës së radiusit në 1/3-tën distale, të shoqeruara me luksacion të kokës së ulnës, me shkeputje të artikulacionit radio-karpal dhe me demtim të indeve të buta përreth është një demtim që nuk haset shpesh në praktiken tonë të përditshme. Aq më të rralla janë demtimet e hapura.

Rasti i parë i përshkruar në literaturë i përket viti 1826, para sësa të përshkruhet nga autori prej të cilit mori emrin kjo patologji-Riccardo Galeazzi, nga Milano, i cili raportoi 18 raste të trajtuara nga ekipi i tij.

Literatura përshkruan një sasi jo të konsiderueshme artikujsh, në krahasim me të tjera sëmundje në fushën e ortopedisë dhe traumatologjisë.

Metodat

Në punimin tonë në kemi marrë në konsideratë 15 raste, në periudhën kohore Qershor 2009-Shkurt 2012. Të gjithë pacientët janë paraqitur fillimisht në urgjencën kirurgjikale të SUQU-së. Të gjithë pacientët në momentin e parë pasi iu është marrë historiku i demtimit, janë ekzaminuar klinikisht dhe radiologjikisht. Radiografite janë kryer me dy projeksione dhe kanë përfshirë dy artikulacionet në kufi me artikulacionin radiokarpal, konkretisht artikulacionin e brýrlit dhe artikulacionet karpometakarpale të dorës. Dy raste nga materiali kanë qenë

fraktura të hapura me ekspozim në njerin rast të ulnës në hapësirën radiokarpale, volarisht, kurse tjetri në ekspozim të frakturës së radiusit, komponentit distal.

Në rastet tona 10 paciente ishin nën 9-12 vjeç, 3 paciente ishin 14-18 vjeç, kurse 2 të tjerët ishin 21 vjeç.

Patologjia

Në literaturën ortopedike kjo diagnozë përshkruhet si demtim traumatik i radiusit i shoqëruar me frakturë së bashku me zhvendosje të ulnës nga inserimi i saj distal në artikulacion. Kjo e shoqëruar me demtim të strukturave fibrokartilaginoze dhe ligamenteve midis karpëve.

Shkaku më i shpeshtë i njohur është ai i rrezimit mbi dorën e shtrirë, me parakrahun në pozicion pronacioni të theksuar. Shkaqet e tjera janë aksidentet automobilistike ose përdredhjet e shprehura të parakrahut.

Fraktura zakonisht ndodh në kufirin mes 1/3-tën mesme-distale të radiusit. Mund të ndodhë që fraktura të ketë me shumë se një fragment ose të ketë kominucion. Në njerin nga rastet tona, e shoqëruar me frakturë të kokës së radiusit. Artikulacioni radio-ulnar distal, fiksohet nepermjet ligamentit kolateral ulnar, ligamentit radio-ulnar anterior dhe posterior, muskullit pronator quadratus. Struktura më e